



Ztalmy [®] ^{CV}
(ganaxolone) oral suspension | 50 mg/mL

Cómo comenzar con **ZTALMY**

*Gigi tiene trastorno de deficiencia de
CDKL5 y está tomando ZTALMY.*

¿Qué es ZTALMY?

- ZTALMY es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar convulsiones asociadas con el trastorno por deficiencia de quinasa tipo 5 dependiente de ciclina (cyclin-dependent kinase-like 5 [CDKL5] deficiency disorder [CDD]) en personas de 2 años de edad o más.
- ZTALMY es una sustancia controlada a nivel federal (CV) porque contiene ganaxolona de la que se puede abusar y provocar dependencia. Mantenga ZTALMY en un lugar seguro para evitar el uso indebido y el abuso. Vender o regalar ZTALMY puede dañar a otras personas y es ilegal. Informe a su proveedor de atención médica si usted o su hijo han abusado o han sido dependientes del alcohol, los medicamentos recetados o las drogas ilegales.
- Se desconoce si ZTALMY es seguro y eficaz en niños menores de 2 años de edad.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y haga clic aquí para consultar la **Guía del medicamento** ([español](#) e [inglés](#)).

Bienvenido a Ztalmy^{one}™

Estamos aquí para *apoyarlo*

Comenzar un nuevo medicamento para las convulsiones puede ser un desafío, pero sepa que no está solo. ZTALMY One, un programa de apoyo integral, está aquí para ayudarlos a usted y a su hijo a lo largo de su tratamiento con ZTALMY®. Este folleto puede ayudarlo a obtener más información sobre el inicio de ZTALMY y los servicios de apoyo que ofrecemos.

Póngase en contacto con ZTALMY One

Nuestro equipo de apoyo dedicado incluye coordinadores de atención al paciente* (disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este) y farmacéuticos, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder las preguntas que pueda tener.

Llame al **1-844-ZTALMY-1** (1-844-982-5691). Escanee el código QR a la derecha para guardar nuestro número en su teléfono.



*Los coordinadores de atención al paciente de ZTALMY One no proporcionan asesoramiento médico ni atención individual al paciente. Si tiene preguntas médicas, consulte a su proveedor de atención médica.

Información importante de seguridad seleccionada

ZTALMY puede causar efectos secundarios serios, entre ellos:

Somnolencia: ZTALMY puede causar somnolencia: Tomar ZTALMY con depresores del sistema nervioso central (SNC), incluido el alcohol, puede aumentar la somnolencia. **No** conduzcan, no operen maquinaria pesada ni realicen otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo ZTALMY los afecta a usted o a su hijo.

- 2 Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y haga clic aquí para consultar la **Guía del medicamento** ([español](#) e [inglés](#)).

Acerca del nuevo tratamiento de su hijo

ZTALMY es el primer y único tratamiento indicado específicamente para las convulsiones asociadas con el trastorno por deficiencia de CDKL5 (CDD) en personas de 2 años de edad o más.



Estudiado en niños y adultos jóvenes con CDD

El estudio clínico incluyó 101 participantes de 2 a 19 años de edad. Los participantes tuvieron convulsiones resistentes al tratamiento asociadas con el CDD.



Se ha comprobado que reduce la frecuencia de las convulsiones en el CDD

En el estudio clínico, ZTALMY redujo significativamente la frecuencia de convulsiones mensuales en comparación con el placebo durante 17 semanas. **Los resultados individuales pueden variar.**

En este folleto encontrará:

- Apoyo para su viaje de tratamiento 4
- Información de dosificación 6
- Cómo administrar ZTALMY 8
- Preguntas frecuentes 12
- Información importante de seguridad 14

 **Ztalmy** [®] 
(ganaxolone) oral suspension | 50 mg/mL

Apoyo a lo largo de su viaje de tratamiento



ZTALMY One es un programa de apoyo integral para usted y su hijo. ZTALMY One ayuda con el acceso y la asequibilidad, y proporciona apoyo y educación continuos con las recetas, para que pueda concentrarse en estar allí para su hijo.



Facilitar el *acceso* al tratamiento

Después de que su médico le recete ZTALMY®, un Coordinador de atención al paciente se comunicará con usted en el plazo de 1 o 2 días hábiles. El coordinador de atención al paciente le informará que ZTALMY One está trabajando con su médico y su proveedor de seguro para verificar sus beneficios y ayudar a analizar su cobertura de seguro. Este proceso puede llevar algo de tiempo, pero un Coordinador de atención al paciente proporcionará actualizaciones semanales sobre el progreso de la confirmación de su cobertura.



Entrega de su *receta*

Una vez que se confirme su cobertura de seguro, recibirá una llamada de un coordinador de atención al paciente, quien programará la entrega de sus recetas y analizará cualquier costo de bolsillo.

Importante: Responda y devuelva las llamadas de **ZTALMY One (1-844-982-5691)** para asegurarse de recibir la receta de su hijo lo antes posible.

Firme el formulario de inscripción proporcionado por su médico para que pueda recibir recursos adicionales e información educativa en el futuro.



Brindar apoyo con las recetas

ZTALMY One tiene programas de apoyo para recetas que pueden ayudar a que su receta de ZTALMY sea más asequible.

- **Programa de ahorros de copagos de ZTALMY One**

A través del Programa de ahorros de copagos de ZTALMY One, los pacientes elegibles con seguro comercial pueden pagar hasta cero dólares por receta de ZTALMY.*

- **Programas de apoyo para recetas ZTALMY One**

Si su hijo no tiene seguro, tiene un seguro limitado o tiene un déficit o una demora en la cobertura, los Programas de apoyo para recetas de ZTALMY One pueden ayudar con el costo del tratamiento con ZTALMY.

*Los pacientes elegibles pueden pagar tan poco como \$0 por receta de ZTALMY por un suministro máximo de 30 días por receta, sujeto a un máximo anual. Los beneficiarios del programa de atención de la salud estatal y federal no son elegibles, incluso si eligen que se los procese como pacientes no asegurados (pago en efectivo). El programa de ahorros no es un seguro médico. Marinus se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta sin previo aviso. Consulte los términos y condiciones completos. Si tiene preguntas, llame a ZTALMY One (1-844-982-5691).

Elegibilidad del programa y términos y condiciones

El programa de ahorro de copagos requiere una receta válida para la suspensión oral ZTALMY (ganaxolona), CV, consistente con la Información de prescripción. El paciente debe tener seguro comercial. La oferta no es válida para pacientes que pagan en efectivo. El paciente debe residir en los EE. UU. o en los territorios de los EE. UU. Los pacientes son responsables de un copago de cero dólares para una receta de ZTALMY por un suministro máximo de 30 días por receta. El valor de la oferta del programa de ahorros de copagos se limita a un máximo anual por año calendario. Para obtener información sobre el límite máximo anual de beneficios, comuníquese con ZTALMY One (1-844-982-5691). Los pacientes no son elegibles para usar esta oferta si son elegibles o están inscritos en un programa de seguro financiado por el estado o el gobierno federal, que incluye, entre otros, Medicare, Medicaid, TRICARE, atención de la salud del Departamento de Asuntos de Veteranos o un programa estatal de asistencia con fármacos recetados. Usted es responsable de informar el uso del programa de ahorros de copagos a cualquier aseguradora comercial, plan de salud u otro tercero que pague o reembolse cualquier parte de la receta que se surta utilizando el programa de ahorros de copagos, según sea necesario. No debe utilizar el programa de ahorros de copagos si su aseguradora o plan de salud prohíbe el uso de programas de copagos del fabricante. Oferta no válida cuando lo prohíba la ley. Programa de ahorros en copagos aceptado solo por la farmacia especializada designada por ZTALMY One. Si cambia el seguro del paciente, se debe notificar a la farmacia de inmediato. En función del cambio en el seguro del paciente, es posible que el paciente ya no pueda participar en el programa de ahorro de copagos. La oferta no es seguro médico. Oferta válida solo en los EE. UU. La oferta está limitada a una por persona durante este período de oferta y no es transferible. La oferta no está condicionada a ninguna compra pasada, presente o futura, incluidas las renovaciones. Marinus se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta y los requisitos de elegibilidad del programa en cualquier momento sin previo aviso.



Información de dosificación

¿Cómo debe su hijo tomar ZTALMY®?



Exactamente según lo recetado



3 veces por día



Con alimentos


Antes de comenzar ZTALMY, lea Cómo administrar ZTALMY en la página 8.

Creado teniendo en cuenta las necesidades de su hijo



Medicamento oral adecuado para las dietas cetogénicas.

ZTALMY es un líquido sin azúcar, con sabor a cereza, que es adecuado para las dietas cetogénicas.



No requiere refrigeración.

Mantenga ZTALMY en un lugar seguro para evitar el uso indebido y el abuso.

Información importante de seguridad seleccionada

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica?

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si usted o su hijo toman: alcohol, opioides, antidepresivos.

- 6 Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y haga clic aquí para consultar la **Guía del medicamento** ([español](#) e [inglés](#)).



Cronograma de administración de ZTALMY

- Durante las primeras 3 semanas, es probable que su proveedor de atención médica aumente la dosis de su hijo cada semana, según qué tan bien tolere su hijo ZTALMY.
- Administre ZTALMY exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica. Su proveedor de atención médica le dirá cuánto ZTALMY debe administrar y cuándo hacerlo.
- Use el adaptador del frasco y las jeringas para dosificación oral proporcionados por la farmacia especializada para administrar ZTALMY. No use una cucharadita ni una cucharada casera.
- Su médico puede ajustar la dosis de ZTALMY a medida que el peso de su hijo cambie.

Use el registro de tratamiento para registrar la dosis de su hijo. Su proveedor de atención médica le dirá cuánto ZTALMY debe administrar y cuándo hacerlo.

Información importante de seguridad seleccionada

Conozca los medicamentos que usted o su hijo toman. Lleve una lista de ellos para mostrarles a su proveedor de atención médica o farmacéutico cuando usted o su hijo reciban un nuevo medicamento.

No conduzcan, no operen maquinaria pesada ni realicen otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo ZTALMY los afecta a usted o a su hijo. ZTALMY puede hacer que usted o su hijo se sientan somnolientos.

Ztalmy [®] _v
 (ganaxolone) oral suspension | 50 mg/mL

Cómo administrar ZTALMY®

Cada paquete contiene:



Frascos de ZTALMY con tapa a prueba de niños

Otros suministros proporcionados:

- Adaptador a presión para el frasco
- Jeringas para uso oral

Su farmacéutico le proporcionará un adaptador a presión para el frasco y las jeringas para uso oral del tamaño adecuado según la dosis recetada.

Si no tiene un adaptador a presión para el frasco y las jeringas para uso oral del tamaño adecuado para usar con su medicamento, llame a su farmacéutico de inmediato (disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana) a través del **programa de apoyo al paciente ZTALMY One™: 1-844-ZTALMY-1 (1-844-982-5691)**.

Nota: Si pierde o daña una jeringa para uso oral o no puede leer las marcas, comuníquese con su farmacéutico para solicitar una jeringa nueva.

Siga estas instrucciones para usar el adaptador a presión para el frasco y la jeringa para uso oral para medir y administrar ZTALMY.

Asegúrese de leer, comprender y seguir estas instrucciones atentamente, a fin de garantizar la administración adecuada de la dosis de la suspensión oral.

Importante:

- Siga las indicaciones de su proveedor de atención médica instrucciones sobre cómo administrar ZTALMY.
- ZTALMY siempre debe administrarse con alimentos.
- Consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico si no está seguro de cómo preparar o administrar la dosis recetada de ZTALMY.
- Utilice siempre la jeringa para uso oral proporcionada por su farmacéutico, para asegurarse de medir la cantidad correcta de ZTALMY. Una cucharadita o cucharada en el hogar no es un dispositivo de medición adecuado y no debe utilizarse.
- No administre ZTALMY después de la fecha de vencimiento que figura en el envase y en cada frasco.
- Use ZTALMY dentro de los 30 días de abrir el frasco por primera vez.
- Después de 30 días de abrir el frasco por primera vez, tire (deseche) de manera segura cualquier ZTALMY que no se haya utilizado.

Preparar el frasco

Agite bien



1

Sostenga el frasco en la mano y agítelo bien, durante 1 minuto.

Siempre agite bien el frasco, durante 1 minuto, luego, déjelo reposar durante 1 minuto, de modo que la espuma que se acumule durante el movimiento se pueda asentar antes de medir y administrar **cada dosis** de ZTALMY. Esto le ayudará a medir la cantidad correcta del medicamento.

Nota: Este paso se realiza para cada dosis del medicamento.

2

Para retirar la tapa a prueba de niños, presione hacia abajo mientras gira la tapa hacia la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj).



3

Perfore y despegue el sello de inducción del frasco.



Nota: Este paso se realiza solo para el primer uso del frasco.

4

Coloque el adaptador firmemente a presión, a fin de introducirlo en el frasco. Sujete con firmeza el frasco, con una mano y, con la otra, inserte por completo el adaptador a presión en el frasco; para esto, debe ejercer una presión constante. Asegúrese de que el adaptador a presión para el frasco esté totalmente insertado. Si no se inserta por completo, las piezas pequeñas, como el adaptador a presión para el frasco, pueden convertirse en un riesgo de asfixia para niños y mascotas.




Nota: No retire el adaptador a presión para el frasco, una vez introducido.

Ztalmy [®] _v
(ganaxolone) oral suspension | 50 mg/mL

Cómo administrar ZTALMY® (continuación)

Preparación de la dosis

Su proveedor de atención médica le dirá cuánto ZTALMY debe administrar.



5

Arme la jeringa para uso oral, empuje el émbolo por completo hacia abajo, luego inserte la punta de la jeringa para uso oral completamente en el adaptador a presión para el frasco. Con la jeringa para uso oral en el lugar de aplicación, ponga el frasco boca abajo.



6

Tire lentamente del émbolo de la jeringa para uso oral, a fin de extraer la dosis necesaria de ZTALMY. Alinee el extremo del émbolo con la marca de su dosis de ZTALMY.


Nota: Las jeringas pueden tener un aspecto diferente al que se muestra en la imagen, según la dosis recetada.



Qué hacer si ve burbujas de aire:

Si hay burbujas de aire en la jeringa para uso oral, mantenga el frasco boca abajo y presione lentamente el émbolo, para que todo el líquido fluya de nuevo hacia el frasco. Repita el paso 6 hasta que las burbujas de aire desaparezcan.

- 7** Cuando haya medido la cantidad correcta de ZTALMY, deje la jeringa para uso oral en el adaptador a presión para el frasco y gire el frasco hacia arriba.



- 8** Retire con cuidado la jeringa para uso oral del adaptador a presión para el frasco.



Administrar ZTALMY

- 9** Apoye la punta de la jeringa para uso oral en el interior de la mejilla y empuje suavemente el émbolo hasta que se administre todo el ZTALMY que se encuentra dentro de la jeringa oral.



No fuerce el émbolo.

No dirija el medicamento a la parte posterior de la boca ni a la garganta. Esto puede provocar ahogos.

- 10** Enrosque bien la tapa a prueba de niños en el frasco; para hacerlo, gire la tapa hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj). No retire el adaptador a presión para el frasco. La tapa a prueba de niños se ajustará encima de este.



Ztalmy [®] _v
 (ganaxolone) oral suspension | 50 mg/mL

Preguntas frecuentes sobre ZTALMY®

P: ¿Cuánto costará ZTALMY?

R: Los Coordinadores de atención al paciente de ZTALMY One™ pueden ayudar a determinar cuánto le costará a usted el ZTALMY de su hijo. ZTALMY One también proporciona programas de apoyo para recetas a fin de ayudar a que el tratamiento sea más asequible. Consulte la página 5 para obtener más información.

P: ¿ZTALMY está cubierto por el seguro?

R: Los Coordinadores de atención al paciente de ZTALMY One trabajarán con su médico y su proveedor de seguro para verificar sus beneficios. ZTALMY One también ofrece programas de apoyo con recetas para pacientes elegibles a fin de ayudar a que el tratamiento sea más asequible. Si tiene preguntas sobre si su seguro cubre ZTALMY, llame a ZTALMY One al 1-844-ZTALMY-1 (1-844-982-5691).

P: ¿Puedo administrar ZTALMY con otros medicamentos?

R: ZTALMY puede administrarse con la mayoría de los otros medicamentos, incluidos los medicamentos anticonvulsivos. En el estudio clínico, el 98 % de los participantes que tomaron ZTALMY también estaban tomando otros medicamentos anticonvulsivos. Los más frecuentes fueron valproato, levetiracetam, clobazam y vigabatrina. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma su hijo, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Informe especialmente a su proveedor de atención médica si su hijo toma alcohol, opioides o antidepresivos.

P: ¿Cómo debo almacenar ZTALMY?

R: Almacene ZTALMY entre 68 °F y 77 °F (entre 20 °C y 25 °C). Siempre almacene ZTALMY en su frasco original en posición vertical. Mantenga la tapa a prueba de niños bien cerrada. Use ZTALMY dentro de los 30 días de abrir el frasco por primera vez. Tire (deseche) cualquier medicamento no utilizado después de 30 días. Mantenga ZTALMY y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

P: ¿Hay edulcorante artificial en ZTALMY?

R: Sí, ZTALMY incluye saborizantes de cereza artificial y sucralosa. La formulación líquida no contiene azúcar y es adecuada para las dietas cetogénicas.

P: ¿Se puede administrar ZTALMY a través de la sonda de alimentación de mi hijo?

R: Pregunte a su proveedor de atención médica sobre la administración de ZTALMY a través de una sonda de alimentación.

Información importante de seguridad seleccionada

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma su hijo, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. ZTALMY puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa ZTALMY. No deje de tomar ni comience a tomar otros medicamentos sin hablar con su proveedor de atención médica.



INDICACIÓN

¿Qué es ZTALMY?

- ZTALMY es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar convulsiones asociadas con el trastorno por deficiencia de quinasa tipo 5 dependiente de ciclina (CDKL5 CDD) en personas de 2 años de edad o más.
- ZTALMY es una sustancia controlada a nivel federal (CV) porque contiene ganaxolona de la que se puede abusar y provocar dependencia. Mantenga ZTALMY en un lugar seguro para evitar el uso indebido y el abuso. Vender o regalar ZTALMY puede dañar a otras personas y es ilegal. Informe a su proveedor de atención médica si usted o su hijo han abusado o han sido dependientes del alcohol, los medicamentos recetados o las drogas ilegales.
- Se desconoce si ZTALMY es seguro y eficaz en niños menores de 2 años de edad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ZTALMY?

ZTALMY puede causar efectos secundarios serios, entre ellos:

Somnolencia: ZTALMY puede causar somnolencia. Tomar ZTALMY con depresores del sistema nervioso central (SNC), incluido el alcohol, puede aumentar la somnolencia. **No** conduzcan, no operen maquinaria pesada ni realicen otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo ZTALMY los afecta a usted o a su hijo.

Pensamientos o acciones suicidas: Al igual que todos los demás fármacos antiepilépticos, ZTALMY puede causar pensamientos o acciones suicidas en una cantidad muy pequeña de personas, alrededor de 1 en 500.

Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si usted o su hijo tienen alguno de estos síntomas, especialmente si son nuevos, si empeoran o si le preocupan:

- Pensamientos acerca del suicidio o la muerte
- Intentar suicidarse
- Depresión nueva o que empeora
- Ansiedad nueva o que empeora
- Sentirse agitado o inquieto
- Ataques de pánico
- Problemas para dormir (insomnio)
- Aparición o empeoramiento de la irritabilidad
- Actuar de manera agresiva, enojarse o violenta
- Actuar sobre impulsos peligrosos
- Un aumento extremo en la actividad y el habla (manía)
- Otros cambios inusuales en el comportamiento o el estado de ánimo

Preste atención a los cambios, especialmente los cambios repentinos en el estado de ánimo, los comportamientos, los pensamientos o los sentimientos. Asista a todas las visitas de seguimiento con su proveedor de atención médica según lo programado.

Interrupción de ZTALMY: No deje de tomar ZTALMY sin antes hablar con su proveedor de atención médica. Interrumpir ZTALMY repentinamente puede provocar que usted o su hijo tengan convulsiones con más frecuencia o convulsiones que no se detienen (estado epiléptico).

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica?

Antes de tomar ZTALMY, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas o las de su hijo, incluso si usted o su hijo:

- Beben alcohol.
- Tienen o han tenido depresión, problemas anímicos o pensamientos o conductas suicidas.

- Han abusado o han tenido dependencia de medicamentos recetados, drogas ilegales o alcohol.
- Tienen problemas hepáticos.
- Están embarazadas o planifican quedar embarazada. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si usted o su hija quedan embarazadas mientras toman ZTALMY. Usted y su proveedor de atención médica decidirán si usted o su hija deben tomar ZTALMY durante el embarazo.
- Están amamantando o planifican amamantar. ZTALMY puede pasar a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé o al bebé de su hija mientras toma ZTALMY.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usted o su hijo tomen, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. ZTALMY puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa ZTALMY. No deje de tomar ni comience a tomar otros medicamentos sin hablar con su proveedor de atención médica.

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si usted o su hijo toman: alcohol, opioides, antidepresivos.

Conozca los medicamentos que usted o su hijo toman. Lleve una lista de ellos para mostrarles a su proveedor de atención médica o farmacéutico cuando usted o su hijo reciban un nuevo medicamento.

¿Qué debe evitarse mientras se toma ZTALMY?

No conduzcan, no operen maquinaria pesada ni realicen otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo ZTALMY los afecta a usted o a su hijo. ZTALMY puede hacer que usted o su hijo se sientan somnolientos.

¿Cuáles son los efectos secundarios de ZTALMY?

Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ZTALMY?”.

Los efectos secundarios más frecuentes de ZTALMY incluyen los siguientes:

- Somnolencia
- Fiebre
- Saliva excesiva o babeo
- Alergia estacional

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ZTALMY. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que les cause molestias a usted o a su hijo o que no desaparezca. **Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA en www.fda.gov/medwatch o 1-800-FDA-1088.** También puede comunicarse con Marinus Pharmaceuticals al 844-627-4687.

Para obtener información adicional, haga clic aquí para consultar la **Guía del medicamento y las Instrucciones de uso** ([español](#) e [inglés](#)) y analícelas con su médico.



The logo for Ztalmy one, with 'Ztalmy' in a bold, dark blue font and 'one' in a smaller, orange script font, all set against a dark blue, brush-stroke-like background.

Apoyo a lo largo de su viaje de tratamiento

A medida que su hijo comience el tratamiento, ZTALMY One lo apoyará en cada paso del camino. ZTALMY One lo llamará todos los meses para:

- Verificar si hay cambios en el peso que podrían afectar la dosis de su hijo
- Proporcionar recordatorios de renovación
- Programar su próxima entrega de ZTALMY®

Recuerde que siempre puede comunicarse con ZTALMY One llamando al **1-844-ZTALMY-1** (1-844-982-5691). Escanee el código QR para guardar nuestro número directamente en su teléfono.



Visite ZTALMY.com/stayinformed para obtener información adicional sobre ZTALMY.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y haga clic aquí para consultar la **Guía del medicamento** ([español](#) e [inglés](#)).



MARINUS, el diseño del círculo y ZTALMY son marcas comerciales registradas de Marinus Pharmaceuticals, Inc., y MARINUS y ZTALMY One son marcas comerciales de Marinus Pharmaceuticals, Inc. © 2024 Marinus Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. PRC-US-Zta-00210 12/24

The Ztalmy logo, featuring a stylized circular icon to the left of the word 'Ztalmy' in a bold, sans-serif font. Below it, the text '(ganaxolone) oral suspension | 50 mg/mL' is displayed in a smaller font.